

Epidermale Reizproben am Hautgesunden und =Kranken mit zahnärztlichen Medikamenten.

Inaugural=Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde in der Zahnheilkunde

vorgelegt der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Friedrich=Alexander=Universität Erlangen

von

Josef Zink,

prakt. Zahnarzt aus Regensburg.

Tag der mündlichen Prüfung: 25. Februar 1929.

Kallmünz

Buchdruckerei von Michael Laßleben

1929

Epidermale Reizproben am Hautgesunden und
=Kranken mit zahnärztlichen Medikamenten.

Inaugural=Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde in der Zahnheilkunde

vorgelegt der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Friedrich=Alexander=Universität Erlangen

von

Josef Zink,

prakt. Zahnarzt aus Regensburg.

Tag der mündlichen Prüfung: 25. Februar 1929.

Kallmünz

Buchdruckerei von Michael Laßleben

1929

Dekan: Prof. Dr. Spuler.
Referent: Privatdozent Dr. Dietel.



Meinen lieben Eltern
in dankbarer Verehrung gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41533907_0033

Epidermale Reizproben an Hautgesunden und -Kranken mit zahnärztlichen Medikamenten.

Es ist in der Dermatologie eine seit langer Zeit bekannte Tatsache, daß verschiedene chemische Körper mit definierbarer (z. B. Senföl), sowie unbekannter Konstitution (z. B. Primelextrakt) durch einmaligen oder erst nach oftmals wiederholtem Kontakt auf der Haut Reaktionen auszulösen vermögen. Je nach Stärke dieser Einwirkungen zeigt sich auch eine Reaktion der Haut in verschiedenen Abstufungen, die in umschriebener Rötung, der Bildung von Knötchen und Bläschen und sogar in Nekrose bestehen kann. In der Regel heilt der Prozeß nachher unter Krusten- und Schuppenbildung ab. Erfolgt der oftmalige Kontakt solcher Substanzen bei Gelegenheit gewerblicher Betätigung und zeigt sich auch die Haut des Betreffenden dafür empfindlich, so kann daraus eine wirkliche Erkrankung der Haut, eine Gewerbeekzem entstehen. Solche Ekzeme sind bei Maurern (Kalk), Bäckern, Wäschfrauen (Seifen, Laugen), Buchdruckern, Malern (Terpentin) und vielen anderen Berufen längst bekannt.

Auch der Zahnarzt kommt bei seiner beruflichen Tätigkeit in häufige Berührung mit chemischen Substanzen differenter Art, sodaß sehr wohl die Möglichkeit zur Entstehung von Berufsdermatosen gegeben ist. Die Beobachtung und Behandlung eines nässenden Ekzems durch Herrn Oberarzt Dr. Dietel an den Fingern eines meiner Kollegen, das infolge Einwirkung von Trikrezol-Formalin entstanden war, gab die Anregung, die in der Zahnheilkunde gebräuchlichen Medikamente einmal in ihrer Wirkung auf die äußere Haut zu untersuchen. Es war dabei der Gedanke vorherrschend, aus einer Anzahl von Medikamenten, die sonst gleichwertig sind und demselben Zwecke dienen, diejenigen herauszufinden, welche durch ihre bessere Verträglichkeit auf der äußeren Haut Zahnarzt und Patient weniger zu reizen vermögen und daher geringere Gefahren für beide in sich bergen.

Bei der Applikation dieser Mittel nebeneinander auf der Haut müßte sich ja die Gelegenheit zu einer vergleichenden Wertung der Reizresultate ergeben.

Bei den Hautreaktionen unterscheidet man nach dem Zeitpunkt ihres Auftretens

1. Sofortreaktionen. Sie treten sofort nach Applikation des Mittels auf und klingen meist nach einer halben, spätestens aber nach 2–3 Stunden ab.

2. Spätreaktionen. Sie erreichen ihren Höhepunkt erst nach 24 Stunden und sind dann am besten abzulesen. Bei unserer Versuchsanordnung kam nur das Auftreten einer Spätreaktion in Frage.

Eine andere Einteilung der Hautreaktionen ergibt sich durch die Verschiedenheit des gewählten Angriffspunktes, die besteht in

kutaner (=epidermale) Applikation und
intrakutaner Applikation (=intradermale) Injektion.

Zur Ausführung unserer Reizproben benutzte ich die kutane Applikation in Form der von J. Jadaslohn angegebenen Methode der funktionellen Hautprüfung, wie sie zur Ermittlung des schädlichen Agens bei Toxikodermien durch irgendwelche chemische Körper benützt wird.

Dieselbe hat folgende Variationen:

- a) Einreiben bzw. Aufstupfen der wirklichen Substanz in bzw. auf die unverfehrte Haut,
- b) Auflegen der Substanz auf die unverfehrte Haut für 24 Stunden unter impermeablem Deckverband,
- c) Auflegen der Substanz auf die skarifizierte Haut unter denselben Bedingungen wie bei b),
- d) Auflegen der Substanz auf eine Pirquet'sche Exkoration ohne Verband.

Ich benutzte die unter b) angegebene Methode, da sie den natürlichen Vorgang der schädigenden Einwirkung einer Substanz auf die Haut am ehesten nachahmt und bei skarifizierter Haut zu viele positive Resultate zu erwarten gewesen wären.

Es wurde also in der Weise vorgegangen, daß ein quadratisches Leinenläppchen von dem Umfang 1×1 cm mit der betreffenden Substanz bestreut oder getränkt auf der mit Äther gereinigten Haut für 24 Stunden luftdicht mit Leukoplast abgeschlossen wurde.

Um fehlerhafte Ergebnisse durch die topographisch verschiedene Empfindlichkeit der Körperbedeckung zu vermeiden, wurde immer, wenn möglich, die Gegend über dem manubrium sterni und die obere Brusthälfte oder die Gegend der Schulterblätter gewählt. Die bezeichneten Stellen weisen nämlich auch sonst einen mittleren Grad von Empfindlichkeit auf.

Bei der Ausführung dieser epidermalen Proben war noch ein wichtiger

Umstand zu berücksichtigen: eine gleichmäßige Dosierung. Das Material, soweit es flüssig war, wurde immer mit einem Glasstab aufgetropft, sodaß von jeder Substanz jeweils ein annähernd gleiches Quantum auf dem Löffchen zur Applikation gelangte.

Bei der Auswahl der zu prüfenden Medikamente konnten natürlich nur solche in Frage gezogen werden, die sich bei der Behandlung von Zahn- und Mundkrankheiten von bleibendem Wert erwiesen haben. Denn fast jedes in der allgemeinen Medizin verwendete Mittel wurde auch in der Zahnheilkunde verlucht und deren Zahl hat sich ins Unermeßliche gesteigert.

So wurden nur zwei Gruppen zusammengestellt, von denen ich die erstere als »Jodreihe«, die zweite als »Phenolreihe« bezeichne.

Unter der Jodreihe befindet sich

1. Jodoform, 2. Jodtinktur, 3. Jod=Akonittinktur, 4. Jothionöl, 5. Jothion=Glycerin= Spiritus, 6. Dijozol, 7. als Ersatz für Jodtinktur: das Metajodin.

Die mit der »Jodreihe« an 15 hautgesunden Personen vorgenommene Hautfunktionsprüfung ergab beim Ablesen nach 24 Stunden folgenden Befund, der zunächst in Tabellenform wiedergegeben ist und um die Übersicht über die Wirkung aller angewandten Präparate an jeder Person vor Augen zu haben. Siehe Schema 1.

Unter Hautgesunde rechneten wir solche Patienten, deren Haut im klinischen Sinne normales Aussehen zeigte und bei denen ferner die Anamnese keinen Anhaltspunkt für eine z. Zeit latente Ekzembereitschaft ergab. Es waren durchwegs Gonorrhoeerkrankte unserer Klinik. Im folgenden sollen die mit jedem Präparat erzielten Ergebnisse einzeln zur Darstellung gelangen. Um jedoch von der Verwendung dieser Mittel in der Zahnheilkunde und ihren Eigenschaften ein Bild zu haben, lasse ich immer eine kurze Erläuterung des betreffenden Medikamentes vorangehen.

Das Jodoform ist für den Zahnarzt ein geradezu unentbehrliches Mittel. Nach Operationen von Zysten, die nach der Methode Partsch II zu einer Nebenbucht der Mundhöhle gemacht werden, folgt eine lockere Tamponade mit Jodoformgaze, bei schwerer Nachblutung aus den Alveolen extrahierter Zähne eine feste Tamponade mit Jodoformgaze. Ausgiebige Verwendung findet es in Pulverform zum Bestäuben der Zahnfleischtaschen bei Alveolarpyorrhoe, bei Gingivitiden, Stomatitiden und Geschwüren. Ferner wird es in Pastenform zur Füllung von Wurzelkanälen nach Exstirpation der Wurzelpulpa benutzt. Seine Fähigkeit Operationswunden asep-

tisch zu halten und das Wundsekret aufzufangen, machen es ungemein wertvoll. Besondere Erwähnung verdient die Schmerzlinderung und leichte Anästhesierung von Mundwunden durch Jodoform und außerdem seine desodorisierende Wirkung.

Die Nachteile des Jodoforms bestehen 1. in dessen Giftigkeit, wenn von ausgedehnten Wunden größere Mengen (über 8 gr.) resorbiert werden. 2. In seinem durchdringenden Geruch. 3. In der Überempfindlichkeit einzelner Personen (Idiosynkrasie) gegen dasselbe und dem Auftreten von Erythemen, Exanthemen, Ekzemen und Dermatitisen.

Bei unseren 15 hautgelunden Versuchspersonen bekamen wir nur zweimal ein Erythem nach Jodoform zu sehen, das jedoch im Laufe eines Tages wieder verschwand. Sonst war mit einem rosigen Farbenton, wie man ihn oft auf der zarten Haut von Kindern sieht, die Stelle bezeichnet, der das Jodoform aufgelegt hatte und in dem man noch nicht etwas akut Entzündliches sehen konnte. Die Entstehung dürfte wohl auf die mechanische Reizwirkung der feinen Jodoformkriställchen zurückzuführen sein. Ein Fall von Idiosynkrasie gegen Jodoform war darunter nicht zu finden. Stellt diese doch eine Ausnahme dar und hierfür mochte unsere Reihe zu klein sein. Vielleicht dürfte eine Idiosynkrasie leichter provoziert werden können, wenn das Jodoform von einer Wundfläche aus Eingang findet, während in unseren Fällen der Schutzwall einer intakten Epidermis das Eindringen verwehrte. Bemerkt sei jedoch, daß nach dem Ablösen der Pflaster mit einem äthergetränkten Tupfer, die zuvor bedeckten Stellen mit bedeutend stärkerer Rötung auf ein leichtes Darüberstreichen antworteten wie die Umgebung (Steigerung der lokalen vasomotorischen Reaktion). Ob diese Erscheinung auf die Wirkung des Jodoform oder Leukoplast zurückzuführen ist, konnte nicht eindeutig entschieden werden.

In der Häufigkeit der Anwendung dürfte dem Jodoform die Jodtinktur nicht nachstehen. Die gewöhnliche Jodtinktur stellt eine 5⁰/₀ige alkoholische Lösung von Jod dar, die Tinctura jodi fortior ist 10⁰/₀ig. Nach der neuen deutschen Arzneiverordnung setzte sich diese aus 7⁰/₀ Jod und 3⁰/₀ Jodkali zusammen, wodurch Ausfällungen vermieden werden sollen und die Mischbarkeit mit Wasser ermöglicht wird. In der Zahnheilkunde wird sie zur Desinfektion des Operationsfeldes und vor dem Einschnitt zur Lokal- und Leitungsanästhesie benutzt. Ihre bewährte Desinfektionskraft wird dabei noch dadurch erhöht, daß sie in die Bakterien eindringt und diese auf der Schleimhaut fixiert. Eine weitere adstringierende

und gerbende Eigenschaft wirkt sich in Festigung lockeren, schwammigen Zahnfleisches aus. Das Verfahren, Jodtinktur bei beginnender Wurzelhautentzündung auf die Gingiva zu pinseln, um die Schmerzen »abzuleiten« wird selbst von Laien häufig verwendet. Es beruht auf einer reizenden und entzündungserregenden Wirkung. Bei zu ausgiebiger Pinselung können der Anwendung auf der Schleimhaut heftiges Brennen und Verätzungen folgen.

Zu den gleichen Zwecken wie die Jodtinktur, wird auch eine Mischung von Jod=Akonittinktur gebraucht.

Bei den Proben mit Jodtinktur kam nun eine recht beträchtliche Anzahl von Einwirkungen zum Vorschein. Von 15 hautgefunden Personen reagierten 13 mit einem deutlichen, unzweifelhaft auf die Jodtinktur zurückzuführenden Effekt, der sich bei geringeren Graden als Erythem mit flammig begrenzter Randzone, als akut entzündliches Ödem mit deutlicher Tastbarkeit der Stelle kundgab, auf die das getränkte Testläppchen eingewirkt hatte. Dreimal wurde eine blasige Abhebung gesehen, nach deren Entfernung eine Erosion zutage trat. Es war also eine die Epidermis auflöckernde und stärker schädigende Kraft tätig gewesen. Bei Fall Nr. 3 sah ich in den nächsten Tagen ein Übergehen der Reizstelle in eine akute Dermatitis, die wie beim echten Ekzem in das Bläschenstadium überging, zur Bildung einer messerrückendicken Kruste führte und nach Abstoßen derselben unter lange dauernder Abschuppung abheilte. Ein Pigmentfleck blieb am Ort dieses Prozesses bestehen. Genau dasselbe vollzog sich bei Fall Nr. 13 und 14, sowie bei Fall Nr. 1, wobei die entzündlichen Erscheinungen aber erst nach mehreren Tagen intensiv aufflammten. Subjektive Symptome wurden während der Liegedauer der Proben als Jucken und Brennen öfters angegeben.

Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß bei unseren Versuchen häufig eine Reizung durch das Leukoplast gesehen wurde, die von der Reizung durch das Medikament deutlich unterschieden werden konnte. Übrigens hat Dukaplast eine wesentlich geringere Schädigung der Haut mit sich gebracht.

Mit der Jodakonittinktur konnten ungefähr dieselben Ergebnisse erzielt werden. Mit einem Ausschlag nach der positiven Richtung waren 11 Fälle zu verzeichnen. 4 darunter zeigten bei Abnahme der Proben Erosionen. Eine deutlich fühlbare Infiltration mit entzündlichem Farbton, der ohne scharfe Grenze in die Umgebung überging, ließ sich bei 5 Personen nachweisen.

Wenn man nun die Folgerung aus der Einwirkung beider Mittel auf die intakte und gesunde Epidermis zieht, so muß man zu der An-

schauung gelangen, daß die Jodtinktur bei einer so langen Einwirkungs-
dauer als ein fast in jedem Fall irritierendes Mittel bezeichnet werden muß.
Der spezifisch reizende Faktor wird dabei in der Bildung und Einwirkung
von Jodwasserstoffsäure vermutet. Als praktisch verwertbar darf aus Obigem
entnommen werden, daß bei der Anwendung von Jodtinktur Vorsicht ge-
boten ist und die Anwendung auf zarte Hautstellen besser vermieden werden
soll, um unangenehme Zwischenfälle und Schädigungen zu verhüten. Es
liegt wohl die Möglichkeit vor, daß bei oftmals wiederholten Applikationen
die Haut eine Reizung im Sinne der Sensibilisierung erfahren und die
lokalisierte Dermatitis artificialis zum echten Ekzem werden könnte. Aus
diesen Gründen war die Umschau und das Suchen nach einem neuen Prä-
parat leicht verständlich bei dem die Nachteile der Jodtinktur vermieden,
die wirksamen und erwünschten Eigenschaften aber beibehalten sein sollten.

Das Jod ist in der Jodtinktur nicht fest sondern nur in schwacher und
labiler Bindung vorhanden. Man trachtete daher danach, das anorganische
Jod in einer festen Bindung mit einem organischen Körper herzustellen.
Eine derartige Verbindung ist das Jothion (J. G. Farbenindustrie=Lever-
kusen), das in seiner chemischen Zusammensetzung ein Dijodhydroxypropan
 $C_3H_5J_2 \cdot OH$ darstellt. Die Indikationsgebiete dieses Mittels sind viel
weiter gezogen, wie die der Jodtinktur. Der enorme Gehalt von ca. 80% Jod,
die von vielen Seiten bestätigte schnelle Resorbierbarkeit derselben lassen es
zur perkutanen Jodtherapie besonders geeignet erscheinen. In der Zahnheil-
kunde wird Jothion wie die Jodtinktur verwendet. Ferner wird es zur
Schmerzlindeung bei Drüenschwellung und Periostitis auch extraoral aufgespritzt.

Zu unseren epidermalen Hautproben wurde es unverdünnt in Form
von Jothion=Öl und Jothion=Glycerin= Spiritus verwendet, die fabrikmäßig
bezogen werden können. Die Ergebnisse, welche man nun hier sah,
waren von der Wirkung der Jodtinktur grundverschieden. Nur ein ein-
ziges Mal war bei einer unserer 15 hautgefunden Versuchspersonen (Fall
Nr. 5) eine leichte oberflächliche Erosion zu sehen (durch Jothion=Öl), bei
Jothion=Glyc.=Spir. überhaupt nicht. Zweimal zeigten sich positive Re-
sultate in Form einer über das Testläppchen hinausgehenden Rötung an.
Einen großen Vorzug besitzt Jothion der Jodtinktur gegenüber durch seine
Farbe, die als schwach gelblich-weiß bezeichnet werden kann, also schlecht-
weg farblos ist. Bei der Applikation der beiden Jothionpräparate in der
ersten Versuchsreihe sah ich nur einmal eine kaum merkliche Verfärbung
der Hauttönung ins Gelbliche. Diesem Umstand lege ich deswegen eine

solche Beachtung bei, da an sichtbaren Körpergegenden z. B. am Hals und im Gesicht, Verfärbungen durch Medikamente, wie sie beispielsweise die Jodtinktur mit sich bringt, als kosmetisch störend empfunden werden. Eine Fältelung der obersten Epidermischichten nach Jothion (in 3 Fällen) verschwand am nächsten Tage wieder und machte einer kleienförmigen Abschuppung Platz, wenn man mit einem Fingernagel darüberstrich. Sie muß als Äußerung des biologischen Testobjekts auf die Einwirkung eines chemisch=fremden Stoffes gedeutet werden. Diese Fältelung bestand in einer Vertiefung der die Haut durchziehenden Furchen wodurch eine gewisse Vergrößerung des Hautreliefs resultierte. Im Übrigen wurde die Einwirkung subjektiv als keineswegs unangenehm empfunden. Es kann auch in dieser Fältelung in keiner Weise eine Schädigung erblickt werden. Bei einem Patienten (Nr. 4) kam auf Jothion=Glyc.=Spir. eine leichte Schwellung zustande, welcher auch schon auf die Applikation der beiden vorgenannten Jodpräparate mit derselben Erscheinung reagiert hatten. Was man gewöhnlich sah, war eine Einsenkung des Testlappchens unter das Niveau der Haut um etwa $\frac{1}{4}$ mm, was durch den ständigen Druck des Heftpflasters verursacht sein mochte. (Kein kollaterales Ödem). Das Wirkungsfeld des Jothions sowie seine Umgebung waren jedoch im Vergleich mit der übrigen Haut unverändert. In der Bindung des Jodes am Propan, einem nicht ganz körperfremden Stoff, liegt wohl die Reizlosigkeit des Jothions begründet. Propan kommt ja als weitere Oxydationsstufe, als Glycerin, im Körper an Fett gebunden vor. Auch reizt Glycerin in unverdünntem Zustand die Haut im Allgemeinen nicht.

Bezüglich der übrigen hervorragenden Wirkungen des Jothions muß ich auf die umfangreiche Spezialliteratur verweisen, da dies aus dem Rahmen dieser Abhandlung fällt.

Seit einigen Jahren ist ein neues Mittel zur Desinfektion der Haut in Anwendung gekommen, bei dem ebenfalls das Jod organisch gebunden ist. Das Dijozol (Firma Trommsdorf Aachen), welches eine alkoholische Lösung einer nach besonderem Verfahren dijodierten Phenolsulfosaure darstellt. Wie bei Jothion geht auch bei Dijozol die Farbe mit einem Stich ins Gelblichweise, ein Vorteil, wie schon oben erwähnt wurde.

Die Befunde an unseren Patienten mit Dijozol waren durchwegs sehr zufriedenstellend: keine Reizung der Haut, kein Erythem oder gar eine Dermatitis, niemals Loslösung der Epidermis oder andere stärkere Grade schädlicher Einwirkung. Die kleine Hautstelle, auf welche Dijozol

bei den Prüfungen eingewirkt hatte, wäre nach Entfernung der Proben von einem Unbeteiligten in keiner Weise wieder zu erkennen gewesen und unterschied sich in nichts von der Umgebung. Einmal sah ich 3 Quaddeln von nicht ganz Weizenkorngroße (Nr. 12) und bei der offenbar sehr empfindlichen Haut des Falles Nr. 13 eine Fältelung, was wir bei dem geringen Grade kaum als ein Zeichen irgend einer Schädigung auffallen können. Wegen dieser relativ geringen Anzahl von Versuchspersonen sei es mir gestattet, auf klinische Erfahrung mit Dijozol und seine Wirkung auf die intakte Haut in einem Aufsatz von Prof. Nehrkorn hinzuweisen, wobei es »in weit über 1000 Fällen zur Anwendung kam«. Er schreibt: »Es sind keine Komplikationen in der ganzen Zeit beobachtet worden, die auf einen Mangel an der Desinfektion der Haut hätten zurückgeführt werden können. Andererseits ist in keinem einzigen Falle, obgleich das Bestreichen der Haut vor der Operation, sowohl bei Kindern, wie auch an empfindlichen Stellen Erwachsener geschah, eine Rötung oder gar ein Ekzem beobachtet worden.«

An der hiesigen Hautklinik wird Dijozol seit Jahren sehr häufig angewendet und läßt die Erfahrungen von Nehrkorn sowohl was Desinfektionskraft, als auch was Reizlosigkeit anbelangt, bestätigen.

Ein anderes, noch wenig bekanntes Präparat, das zwar kein Jod enthält, infolge seiner desinfektorischen Kräfte jedoch als Ersatz der Jodtinktur geeignet ist, nämlich das Metajodin der Lingner Werke soll zum Schluß der »Jodreihe« einer Untersuchung nach unseren Gesichtspunkten hin, unterzogen werden. Das Metajodin besteht nach Angaben der Herstellerfirma aus einer alkoholischen Lösung, eines komplexen Eisensalzes, an das in der Hauptsache Brom gebunden ist und welches daneben noch eine geringe Menge von Chlor, Hypobromid und Rhodanfallen enthält.

Die in der üblichen Weise vorgenommenen Hautfunktionsprüfungen ergaben bei 15 verschiedenen hautgefunden Personen 11 als negativ zu bezeichnende Resultate. Abgesehen von der Verfärbung durch das Präparat — die Farbe gleicht völlig der der gewöhnlichen Jodtinktur und kann mit Wasser leicht entfärbt werden — waren stärkere, der klinischen Wahrnehmung zugängliche Alterationen der Haut in diesen Fällen nicht zu erkennen. Etwa in einem Viertel der Fälle antwortete die dem Metajodin ausgesetzte Haut mit einer Fältelung, oberflächlichen Abschilferungen, an die sich keine weiteren entzündlichen Vorgänge angeschlossen. Zweimal kam eine Läsion der Haut in Gestalt kleinster Petechien (Nr. 7 und

Nr. 11) zustande. Nur ein einziges Mal konnte bei der ausgesprochenen überempfindlichen Haut des Falles Nr. 13 eine heftigere Entzündung beobachtet werden. Im Ganzen ergibt sich hiermit, daß Metajodin bei unseren Versuchen am Hautgesunden in unverdünnten Zustand in etwa einem Viertel der Fälle nach 24stündiger Einwirkung eine gewisse Reizwirkung zeitigte, also weit verträglicher ist, wie beispielsweise Jodtinktur. Von diesem Gesichtspunkt aus muß es daher der Jodtinktur als weit überlegen gelten. Ein geringer Grad von Hyperämisierung durch Metajodin kann in geeigneten Fällen als günstiger Heilfaktor bewertet werden. Diese Ergebnisse befriedigen, die von dem Erfinder gemachten günstigen Erfahrungen, welche durch diese Nachprüfung unterstrichen zu werden verdienen.

Die Medikamente der »Jodreihe« wurden nun auf morphologisch gesund aussehende Partien von Hautkranken zur Einwirkung gebracht, um daraus zu ersehen, welchen Erfolg hier die qualitativ gleichen Reize hervorbringen. Unter Hautgesund wurden wie schon auf S. 7 erwähnt, Patienten mit anamnestisch und klinisch gesunder Haut gezählt. Unter Hautkranke rechneten wir daher Patienten mit Ekzem, Lichen ruber planus, Psoriasis usw. Die Erfahrung, daß das Bestehen eines primären Krankheitsherdes, z. B. eines lokalisierten Ekzems eine höhere Krankheitsbereitschaft, manchmal auch an weit entfernten Gegenden bedingt, macht eine besondere Vorsicht bei der Anwendung hautreizender Substanzen notwendig. Von diesem Gesichtspunkt aus wurde die sonst übliche Menge etwas verringert zur Applikation gebracht, um z. B. bei abheilenden Ekzemplfällen nicht einen neuen Krankheitsausbruch zu provozieren. Die Resultate sind auf Tabelle II zusammengefaßt.


Im Großen und Ganzen erhellt daraus, daß eben mit den gleichen Stoffen, die zuvor eine Reizwirkung ausgelöst haben, ein ähnliches Verhalten bei der Reihe der Hautkranken zu verzeichnen ist. Jodoform erzeugte nur dreimal ein Erythem, das nur kurze Zeit anhielt.

Zahlenmäßig tritt diesmal die Jodtinktur mit ihrer entzündungserregenden Fähigkeit nicht zu sehr in den Vordergrund, die Intensität der Einwirkungen erreicht aber bei der überwiegenden Anzahl der positiven Fälle einen weit höheren Grad. Ein endzündlicher Reiz ließ die der Einwirkung ausgesetzten Stellen über das Niveau der Haut hervortreten und machte sie dem tastenden Finger als infiltrierte Partien genau abgrenzbar. Von der endzündlich aussehenden Epidermis waren meist einige kleine Stellen so markiert, daß sie auch beim vorsichtigen Abnehmen des Pflasters unter Zuhilfenahme von Äther sich ablösten,

Ein auffallendes Ergebnis zeigte die Mischung Jodakonittinktur durch die Verschiebung des Verhältnisses von positiven und negativen Resultaten im Vergleich mit der ersten Versuchsreihe. Bei 8 von 14 Personen zeigte sich keine oder bloß eine unverwertbare geringe Reaktion, die Verfärbung durch das Präparat außer Acht gelassen. Der übrige Teil der Patienten bot das übliche Bild, wie es chemische Substanzen mit entzündungserregender Eigenschaft nach solcher Einwirkungsdauer zurückzulassen pflegen. Bei zwei Fällen (Nr. 10 und Nr. 11) von chronischem Ekzem, bei denen die Gefahr einer Provokation des Leidens nahe lag, wurden die epidermalen Proben nur mit verkürzter Einwirkungsdauer (18 Stunden) aufgetragen. Trotzdem kam ein deutlich positiver Ausschlag zustande. Hingegen erwies sich ein anderer Patient (Nr. 9) mit ausgebreitetem chronischem Gewerbeekzem an den Händen allen Einwirkungen der »Jodreihe« gegenüber als unempfindlich. Eine Erklärung, die diesen verschieden gearteten Ausfall von qualitativ gleichen Reizen gerecht werden könnte, dürfte sich wohl nicht so leicht in unanfechtbarer Weise finden lassen.

Man kann sich vorstellen, daß nach der Lehre von der Ätiologie des Ekzems die Entstehung bei den einzelnen Fällen auf eine Überempfindlichkeit gegen ganz bestimmte Stoffe zurückzuführen war. Es bestand aber keine Überempfindlichkeit gegenüber den in unserer Versuchsreihe angewendeten Stoffen. So kam es, daß sich bei den betreffenden Hautkranken mit Jodakonittinktur keinerlei bemerkenswerte Reaktionen erzielen ließen.

Bei Patient Nr. 1, der an ausgebreiteter Acne vulgaris (es waren fast nur mehr die Arme frei und dort wurden auch die Proben aufgelegt), hatte ich Gelegenheit nach Abnahme der Pflaster 3 verschiedene Dermatitisden sich entwickeln zu sehen und ihren Ablauf verfolgen zu können. Zur Veranschaulichung dieser Vorgänge möge nachfolgendes Schema der Ekzestadien nach Kreibich dienen.



Eine blasige Abhebung (E. madidanz) an der Einwirkungsstelle der Jodtinktur heilte unter Krustenbildung ab. Siehe Pfeil 2 !.

Ein Erythem an der Einwirkungsstelle der Jodakonittinktur gelangte vom maculösen und papulösen Ekzestadium auf dem Umweg (Pfeil 3) über Bläschen und Pustelbildungen zum schuppenden Endstadium.

Auf dem Wirkungsfeld des Metajodins entwickelte sich aus einer leichten Fältelung und unscheinbaren Rötung erst in den nächsten Tagen ein makulöses und papulöses Ekzem, das aber auf dem kürzesten Weg (Pfeil 4), das Ziel, ekzema squamosum erreichte.

Die beiden Jothionpräparate lieferten nur einmal zusammen (bei 30 Proben) ein leichtes Erythem, was für ihre Reizlosigkeit spricht und ihre Anwendung auch auf empfindlicher Haut unbedenklich erscheinen läßt. Eine völlige Reizlosigkeit zeigte auch diesmal wieder das Dijozol. Nur eine feine Abfärbung der Hornschicht an der Einwirkungsstelle war beim Kratzversuch mit dem Fingernagel ersichtlich. Die Verträglichkeit des Mittels auch beim Hautkranken hat sich damit gut erkennen lassen.

Überraschenderweise bietet das Metajodin bei dieser Versuchsreihe von 15 Patienten mit Hauterkrankungen nur einmal ein Reizresultat, dessen weitere Entwicklung zum ekzema squamosum bei dem Fall Nr. 1 bereits beschrieben ist. Das Auftreten eines solchen entzündlichen Reizes mit einer gewissen Latenzzeit konnte ich bei keinem anderen Patienten mehr beobachten. Einige entzogen sich allerdings der weiteren Beobachtung, da sie vorher als geheilt die Klinik verließen. Bis zum Entlassungstage waren sie jedoch an den Stellen der Reizproben von Entzündungserscheinungen frei. Ein Auftreten nach dieser Zeit ist sehr unwahrscheinlich, zumal Metajodin bei ihnen auch keinen primären Reiz ausgeübt hatte.

Damit verlassen wir die »Jodreihe« und wenden uns einigen Versuchen mit einer anderen Gruppe von chemischen Stoffen zu, die ich unter dem Namen »Phenolreihe« zusammenfasse. Sie alle dienen in der Zahnheilkunde gleichen Zwecken. Es handelt sich um 1.) Carbonsäure, 2.) Chlorphenol, 3.) Chlorphenolkampfer, 4.) Trikresol-Formalin und 5.) Eugenol mit welchen die antiseptische Behandlung der Pulpahöhle und der Wurzelkanäle durchgeführt wird.

Rein willkürlich und ohne daß ein chemischer Zusammenhang bestünde, füge ich den Proben mit der »Phenolreihe« noch die arsenige Säure hinzu, um eines der wichtigsten Medikamente des Zahnarztes bei unseren Versuchen

nicht unberücksichtigt zu lassen. Die arsenige Säure ist nämlich das sicherste Mittel zur Abätzung der entzündeten Pulpa. Die zusammengefaßten Ergebnisse sind aus der Tabelle 3 ersichtlich.

Die Carbonsäure, das Phenol, hat mit der Lister'schen Lehre von der Antisepsis in einem ungeheuren Siegeszug seinerzeit eine neue Ära in der Chirurgie eröffnet. In der heutigen Zeit ist jedoch ihr Anwendungsbereich durch die Asepsis stark eingeengt worden. Zur Einengung ihres Indikationsbereichs trug auch noch ihre nicht unbeträchtliche Giftigkeit bei. In der Zahnheilkunde ist sie heute noch ein brauchbares Antiseptikum. Es wird z. B. ein damit mäßig getränktes Wattebäufchen nach Abtragung der devitalisierten Kronenpulpa auf die in den Wurzelkanälen restierenden Stümpfe gelegt. Unter einem festen Verschuß bleibt es so zwei Tage liegen. Damit sollen erstens die eingedrungenen Bakterien vernichtet werden, 2. die Nervenstümpfe und ihre feinsten Verzweigungen bis zum Foramen apicale anästhesiert und gehärtet werden (beides beruht auf Ätzwirkung), um sie dann schmerzlos und möglichst zusammenhängend herausnehmen zu können.

Da die Ätzwirkung der konzentrierten Carbonsäure bekannt ist, wurden die Proben bei 3 Patienten in einer Verdünnung

1 : 100 in Wasser auf dem Rücken aufgelegt. Die Lösung war aber keine einwandfreie und diese drei Versuche können daher mit den übrigen nicht zusammen verwertet werden. Durch einen Zufall blieb ein Tropfen des zu Boden sinkenden Phenols an der zur Entnahme benutzten Pipette hängen, sodaß bei einem Fall (Nr. 5) eine oberflächliche Nekrose entstand. In der Ausdehnung eines Zehnpfennigstückes war das Epithel gleichmäßig milchigweiß getrübt. In einigen Tagen erfolgte eine Demarkierung und allmähliche Abheilung dieser Stelle unter dicker Kruste, mit Bildung einer roten Zone. Bei den nämlichen 3 Patienten erzeugte auch Trikreosol-Formalin in derselben Verdünnung 1 : 100 in Wasser zweimal eine Nekrose des Epithels in Markstückgröße unter demselben Bild, und einmal ein Erythem, was nur wiederum auf denselben eben beschriebenen Umstand der fehlerhaften Versuchsanordnung zurückgeführt werden kann, wie aus den folgenden Versuchen hervorgehen wird.

Die Verdünnungen wurden nun mit Äther hergestellt, worin sich Phenol und auch die übrigen Ringverbindungen sehr leicht lösen. Bei 4 Versuchen mit der Verdünnung 1 : 100 in Äther zeigte sich wohl zweimal eine leichtere Fältelung in der Epidermis als Ausdruck einer leichten schädigenden Einwirkung, aber auch dann kam kein stärkerer

Grad einer solchen zur Beobachtung als darauf zweimal Phenol in einer Lösung von 2 : 100 und in weiteren 5 Fällen in einer Verdünnung von 3 : 100 aufgelegt wurde. In diesen Konzentrationen haben also die Phenolauflagen kein einziges positives Reizresultat ergeben, auch keine Verfärbung hinterlassen. Da es anästhesierend wirkt, hat sich auch kein subjektives Symptom bemerkbar gemacht.

Ein sehr geschätztes Mittel zur Wurzelbehandlung haben wir in dem Chlorphenol (mono- para- Chlorphenol), für das besonders Walkhoff eingetreten ist. Die bakteriziden Eigenschaften der Carbonsäure hat es durch die Zuführung von Chlor in erhöhtem Maße. Da es auf die Pulpa und deren Nervenendigungen stark anästhesierend wirkt, wird es, um nur ein Beispiel herauszugreifen, dazu benutzt, die gereizte Pulpa zu beruhigen und das Dentin gegen die Schmerzen beim Bohren abzustumpfen. Ein Wattekügelchen wird damit angefeuchtet und in die von cariösen Massen gereinigte Zahnhöhle unter undurchlässigem Verschluss gelegt. Tags darauf kann fast schmerzlos die Cavität *lege artis* zu Ende präpariert werden und die Füllung gelegt werden. Dieses Verfahren empfiehlt sich besonders bei den sehr empfindlichen Cavitäten am Zahnhals.

In den aus der Tabelle ersichtlichen Konzentrationsstufen hat es nur einmal ein schwaches Erythem hervorgerufen und zwar bei einem Patienten, der auch auf Chlorphenolkampher in derselben Verdünnung mit demselben Reizeffekt geantwortet hatte. (Verd.: 1 : 100) In den übrigen 11 Fällen war außer einer leichten Einwirkung auf das Epithel nichts zu sehen.

Zur Ausheilung von Granulationsprozessen geringeren Umfangs um die Wurzelspitze empfiehlt Walkhoff eine Mischung von Chlorphenol mit Kampher. Ich zitiere wörtlich: »Die wichtigste Eigenschaft des Präparates ist, daß es überhaupt kein Gewebe, geschweige denn stürmisch den Kontakt verätzt, wie es die Carbonsäure tut, sondern durch allmähliche Zersetzung die Carbonsäure frei werden läßt. Immerhin darf die auftretende Ätzwirkung besonders auf das Epithel bei längerem Verweilen nicht unterschätzt werden.« Die Anwendung geschieht dabei in der Weise, daß einige Tropfen mit einer Pinzette vor den Eingang des Wurzelkanals gebracht werden und hierauf die Flüssigkeit mit dünnen biegsamen Sonden bis über das Foramen apicale hinaus gepumpt wird.

Chlorphenolkampher löste in unseren Verdünnungen zweimal unter 12 Versuchspersonen mit gesunder Haut eine deutlich erkennbare Reaktion aus.

Einmal eine noch stärkere Irritation in Form einer entzündlichen Infiltration (bei Verd. 3 : 100). Ich führe das auf die Gegenwart des Kamphers zurück, da in der vorhergehenden Reihe mit Chlorphenol nur ein und noch dazu schwacher Reizeffekt zu verzeichnen war und hier an denselben Personen und unter den gleichen Bedingungen doch schon eine etwas größere Anzahl positiver Resultate vorliegt. Eine geringfügige örtliche Reizwirkung im Sinne einer Hyperämisierung durch Kampher auf die Haut wird ja therapeutisch verwendet.

Zur Desinfektion verjauchter und gangränöser Wurzelkanäle haben wir in dem Trikresol-Formalin ein souveränes Mittel. Nach vorsichtiger Entfernung des septischen Kanalinhalt wird ein damit getränkter Wattefaden in den Kanal gebracht und impermeabel verschlossen. Die entstehenden Dämpfe dringen in die feinsten Verzweigungen und töten die Bakterien. Das Verschwinden des penetranten Gangrängeruchs zeigt den Erfolg an. Den starken gewebsschädigenden Charakter verliert das Formalin in dieser Verbindung durch das Kresol. Aber gerade durch Trikresol-Formalin erworbene Überempfindlichkeitszustände wurden schon öfters beschrieben.

Bei unseren stark verdünnten Lösungen (1—3 : 100) konnte eine ekzematogene oder gewebsschädigende Fähigkeit des Trikresol-Formalins nicht recht gut zur Auswirkung kommen. Nur einmal zeigte sich ein wenig Rötung an der Einwirkungsstelle bei einem 16jährigen Jungen, die ohne weiteres Zutun wieder verschwand.

Wir haben bei der Anwendung des Trikresol-Formalins zu Reizversuchen deswegen zu so geringen Konzentrationen gegriffen, weil wir durch früher vorgenommene Reizversuche (durch Herrn Priv. Dozt. Dr. Dietel) eine regelmäßig eintretende Gewebsschädigung durch unverdünntes Trikr.=Form. auch auf normaler Haut aufweisen konnten.

Das Tr.=Form. führte bei dem in der Einleitung erwähnten Zahnarzt mit Ekzem an den Fingern nach Anwendung an der Stelle der aufgelegten Reizprobe zu einer 2 mm tiefen Gewebstnekrose; das entstandene Geschwür heilte erst nach etwa 14 Tagen wieder aus. Bei 4 hautgefunden Versuchspersonen führte die mit Tr.=F. vorgenommene Reizprobe zu genau demselben Ergebnis. Es war hier die Gewebstnekrose nur dadurch in geringerem Ausmaße wie in dem zuerst beschriebenen Falle aufgetreten, weil die Zeit der Einwirkung, die im ersten Falle 24 Stunden betragen hatte, auf 6 und 8 Stunden herabgesetzt worden war. Wir haben auch bei 3 weiteren Versuchspersonen mit den dreifach verdünnten Lösungen ausgesprochene Erosionen an der Einwirkungsstelle zu erzielen vermocht.

Diese Erfahrung hielten wir für genügend, um die gewebsschädigende Wirkung des Tr.-F. in stärkerer Konzentration zur Anschauung zu bringen.

Als letzter Vertreter der Phenolreihe wurde das Eugenol auf seine epidermalen Reizeigenschaften in einigen Versuchen untersucht. Das Eugenol ist bis zu 80 % im Nelkenöl enthalten, das schon seit altersher auch von Laien auf Watte geträufelt in den schmerzenden kariösen Zahn gelegt wird. Es hat eine beruhigende und milde Wirkung auf die entzündete Pulpa wie auf die Wurzelhaut.

Zu den Versuchen bei 10 hautgefunden Patienten benutzte ich Eugenol in unverdünntem Zustand, in der Annahme, höchstens nur geringe Einwirkungen erwarten zu dürfen. Es trat aber in der Hälfte der Fälle eine deutliche Schädigung ein, die sich in einer Zunahme der Konsistenz und einer Schwellung beim Darübergleiten des tastenden Fingers über die Haut kundgab. Die Epidermis sah wie zerknittertes feines Seidenpapier aus und hatte die bräunliche Farbe des Präparates angenommen. Bei einer Patientin hatte sich am nächsten Tage eine kirschgroße Blase auf der Einwirkungsstelle gebildet (Fall Nr. 12), die bald unter dem starken Druck des Serums einriß, sodaß die nässende Grundfläche zutage trat. Für manchen dürfte also das Eugenol einen nicht unwesentlichen hautreizenden Faktor in sich bergen wenn er häufig damit in Berührung kommen sollte.

Als letzter Reizstoff wurde noch ein anderes Arzneimittel ohne ringförmige Konstitution, die arsenige Säure, zu einigen epidermalen Reizversuchen herangezogen. In der Zahnheilkunde wird damit die erkrankte Pulpa als »ein verlorenes Organ« devitalisiert. Man beschickt ein stecknadelkopfgroßes Wattekügelchen mit einer sehr geringen Menge der Arsenpaste und läßt es unter hermetischem Abschluß 1–2 Tage auf die Pulpa einwirken. Arsenverbindungen, darunter besonders die dreiwertigen, haben in der Medizin eine weitgehende Verwendung gefunden.

Wegen der Ätzwirkung des Arsens, das allerdings erkrankte Gewebspartien bevorzugt, wurde die zur Probe benutzte Ätzpaste mit Euzerin im Verhältnis 1 : 30 verdünnt. Bei einem Selbstversuch und bei weiteren anderen 7 hautgefunden Patienten verursachte das in Gerstenkorngröße aufgetragene Quantum nach 24stündiger Einwirkung nicht die geringste sichtbare Schädigung. Zwei andere Proben aber zeigten beim Ablösen ein Aussehen, das man mit einer Abschürfung, gleich einer Pirquet'schen Exkoriation, mit dazwischenliegenden Epithelfeln vergleichen möchte. Mit anderen Worten: Ätzwirkung mit oberflächlichem Substanzverlust.

Auf die Ergebnisse mit den Phenolpräparaten und der arsenigen Säure zurückblickend, kann man die Folgerung ziehen, daß in der angewandten Konzentration (1—3 : 100) diese chemischen Körper keinen Reiz auf die gesunde Haut ausüben, da sie nur negative Resultate lieferten. Das unverdünnte Eugenol und Trikreol-Form, dagegen müssen als kräftige Reizstoffe angesehen werden.

Nun wurden mit der Konzentration 3 : 100 der Präparate der Phenolreihe noch bei weiteren 4 hautkranken Patienten Versuche angestellt. Die Einwirkungszeit wurde verkürzt angesetzt, da es sich bei 3 Fällen um akutes Ekzem und einmal um Pforialis handelte.

Auch hier hat man mit Phenol keine stark ausgeprägten klinischen Symptome zu Gesicht bekommen. Der Einwirkungsort war zweimal nur durch eine Schwellung von seiner Umgebung abzutrennen, ohne daß noch besondere weitere Kennzeichen irgendwelcher Schädigung vorhanden gewesen wären. Außerdem fiel die Glanzlosigkeit, das Fehlen eines Lichtreflexes an den Prüfungsfeldern, auf, sodaß man doch an eine feinste praktisch bedeutungslose Einwirkung auf die Hornzellen denken kann. Dasselbe gilt auch für die mit »negativ« bezeichneten Reizproben mit Chlorphenol und Chlor-Phen.-Kampher.

Chlorphenol erzeugte nur einmal, das gekampherte Präparat, zweimal eine schwache Rötung an ihrer Teststelle, die mit einer stärkeren Prominenz der Follikelmündungen in den begrenzten Gebieten verknüpft war. Der von Trikreolformalin erwartete Reizerfolg trat auch mit der Konzentration 3 : 100 noch nicht ein. Nur eine der 4 Patientinnen zeigte eine entzündliche Schwellung als positives Resultat. Es ergibt sich hieraus, daß das Auftreten einer Reizwirkung, wenn auch individuell verschieden, von einer bestimmten Konzentration und Menge des Mittels abhängig genannt werden muß. Bei denselben 4 Patientinnen kam mit der Arsenpasta in der Verdünnung 1 : 30 dreimal ein positiver Reizausfall zustande, womit eine stärkere Bevorzugung der Haut des Ekzematikers gegenüber einem völlig Hautgefunden angedeutet ist. Die Proben wurden schon nach 18 Stunden abgenommen wegen der Befürchtung, stärkere Schädigungen zu setzen. Ohne Zweifel hätte eine 24stündige Liegedauer noch stärkere Resultate ergeben, was wir mit Rücksicht auf unsere Patienten vermeiden wollten.

Ein positives Resultat lieferte in allen vier Fällen das Eugenol. Es bestätigt sich damit die schon an der vorhergehenden Versuchsreihe gemachte Wahrnehmung der besonders intensiven Reizbarkeit dieses Mittels.

Bei der Patientin mit Psoriasis lag ich außerdem nach Abnehmen einer jeden Probe eine starke Reizung durch das Heftpflaster. Verwendet wurde das Baiersdorff'sche Leukoplast.

Die Phenolpräparate benutze ich nunmehr in unverdünntem Zustand zu einigen Proben zunächst bei mir selber und dann bei 3 Patienten mit abheilendem Ekzem.

Während die konzentrierte Carbonsäure in allen vier Fällen einen das Gewebe angreifenden Charakter erkennen ließ, kam bemerkenswerter Weise ein solcher Effekt bei dem chemisch doch nahe verwandten Chlorphenol und der Mischung von Chlorphenol mit Kampher nur einmal zustande.

Das Epithel der Mundschleimhaut wird damit bekanntlich stark geätzt.

Eine kräftige Reizwirkung verursachte bei 3 hautkranken Personen das Trikreolformalin, während sich ein Patient dagegen refraktär verhielt, der sich schon gegen die beiden Chlorverbindungen als tolerant erwiesen hatte.

Im Gegensatz dazu stehen die auf Seite 21 gesehenen Versuchsergebnisse.

Die Arsenpasta wurde auch diesmal nicht in reinem Zustande verwendet, weil die Gefahr von tieferen Zerstörungen dabei eine zu große war. Einem gerstenkorngroßen Quantum der Verdünnung 1 : 30 fügte ich ein siednadelgroßes Stück der unverdünnten Paste hinzu. Es wurde darnach das Auftreten einer Rötung und Schwellung beobachtet. Gleichzeitig machte sich eine Abstoßung von Epithel bemerkbar, sodaß eine Erosion zutage trat. Die unverdünnte Paste hätte wohl eine tiefgreifende Schädigung der Haut mit sich bringen können. Die Reizwirkung des unverdünnten Eugenols gab sich wiederum bei den 3 Proben durch zwei deutliche Befunde und einem weniger ausgeprägten einer entzündlichen Reaktion zu erkennen.

Die Erscheinungen nach den Reizproben mit konzentrierter Carbonsäure und dem unverdünnten Trikreolformalin spielten sich bei mir wie bei den anderen Versuchspersonen mit positiven Resultaten in folgenden Veränderungen ab. In der ganzen Ausdehnung des Testfläppchens zeigte die Haut an der Einwirkungsstelle des Trikreol-Form. nach 18 Stunden einen dunkelroten stumpfen Farbton, der sich nicht anämisieren ließ. Die Teststelle von der Phenolauflage war bräunlich gefärbt und machte bei Druck darauf einem rötlicheren Farbton Platz. An beiden Stellen löste auch ein Darüberhinwegstreichen das Gefühl des Brennens aus. Das Braun der Phenolstelle verwandelte sich in zwei Tagen in ein Rot von der gleichen Tönung wie an der Stelle des Trikreol-Form. Mit unverminderter Stärke

bestand dieser Befund nahezu eine Woche, ein Beweis für die kräftige Einwirkung dieser Präparate. Dafür sprechen die mehrfach erwähnten Versuchsergebnisse (S. 21). Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß ein längeres Einwirken oder eine etwas größere Menge gleich von Anfang an eine tiefe Nekrose hätte erzeugen können.

Die Stelle von Trikresolformalin erinnerte besonders im Aussehen an das Bild eines chronischen lichenifizierten Ekzems.

Mit der Bildung kleiner, ziemlich festhaftender Schuppen verschwand die Rötung und der Prozeß heilte ohne weitere Behandlung ab. Nach 12 Tage nach der Einwirkung waren beide Stellen, an denen die Noxe eingewirkt hatte, mit feinen Schuppen bedeckt und durch braune Pigmentierung gekennzeichnet.

Zusammenfassung.

Es werden epidermale Reizproben mit 13 in der Zahnheilkunde gebräuchlichen Medikamenten nach der Jadasohn'schen Methode der funktionellen Hautprüfung ausgeführt. In etwas mehr als der Hälfte von 362 Proben lieferte die Haut positive Reizantworten. Die Anzahl der untersuchten Personen betrug 53.

Von den Mitteln, die unter dem Namen »Jodreihe« nebeneinander aufgetragen wurden, ergab die Jodtinktur die meisten und stärksten Reizresultate. Daran schließt sich in geringem Abstand die Mischung von Jod-Akonittinktur. Eine Reizwirkung in mäßigem Grade hat das Metajodin, ein jodfreies Ersatzpräparat für die Desinfektionszwecke der Jodtinktur, gezeigt. Eine sehr gute Verträglichkeit auf der Haut ergaben die Proben mit den Jothion-Lösungen. Am günstigsten von den Mitteln der »Jodreihe«, hat jedoch das Dijozol abge schnitten, dem man eine völlige Reizlosigkeit bei den untersuchten Fällen zusprechen darf.

Die zweite Gruppe von zahnärztlichen Medikamenten, unter dem Namen »Phenolreihe« zusammengefaßt, lieferte in den Verdünnungen 1 : 100, 2 : 100, 3 : 100, wenig positive Resultate. Bloß die Kampher-Chlorphenol-Lösung reizte hier mehrmals. Bei 4 Versuchen mit der »Phenolreihe« in unverdünnter Konzentration ergab Carbolsäure jedesmal, Trikresolformalin in drei Fällen, starke Reizresultate. Unverdünntes Eugenol reizte unter 14 Proben 9 mal kräftig. Bemerkenswert ist es, daß Chlorphenol- und Kampher-Chlorphenol-Lösung unverdünnt bloß je ein positives Ergebnis brachten, was mit einem langsameren Eindringen in die Haut durch die mehr ölige Beschaffenheit beider Präparate in Zusammenhang gebracht wer-

den muß. Das Chlorphenol hat damit einen gewissen Vorzug vor den anderen Mitteln aufzuweisen.

Einige Versuche wurden noch mit arseniger Säure in Pastenform angestellt. Es zeigte sich mehrmals eine leichte Schädigung der Haut, wenn in den aufgelegten gerstenkorngroßen Stückchen die Verdünnung 1 : 30 nur wenig überschritten wurde. Im Interesse unserer Patienten wurde daher von einem Versuch mit unverdünnter arsenischer Säure abgesehen.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Privatdozent Dr. Dietel für die Stellung des Themas und die liebenswürdige Unterstützung bei der Ausführung der Arbeit meinen wärmsten Dank auszusprechen. Für die Überlassung der Patienten möchte ich hiermit Herrn Professor Dr. Hauck ergebenst danken.

Lebenslauf.

Ich, Josef Zink, bin am 17. 1. 05 zu Regensburg geboren als Sohn des Lohnkutschereibesitzers Joh. Zink und seiner Ehefrau Anna, geb. Huber. Nach vierjährigem Besuch der Volksschule zu Regensburg trat ich dortselbst in das Neue Gymnasium über und gehörte von der 4. Klasse der neugegründeten realgymnasialen Abteilung an. Im März 1925 legte ich die Reifeprüfung ab. Im Mai 1925 begann ich an der Universität in München (3 Semester) das Studium der Medizin und Zahnheilkunde. Die zahnärztliche Vorprüfung bestand ich im Nov. 1926 zu Erlangen und daselbst mein zahnärztliches Staatsexamen im November 1928. Die Approbation erhielt ich am 30. Nov. 1928. Die letzten 5 Semester hatte ich in Erlangen studiert.

Schema I. Hautgefunde.

Nr.	Da= tum	Name	Jodo= form	Jodtink= tur	J'Ako= nittink.	Jothi= on=Öl	Joth. Glyc. Spir.	Dijo= zol	Meta Jodin
1	14.1.	M. m.	—	—	—	—	+	—	—
2	14.1.	V. m.	+	+++	+++	—	—	—	+
3	14.1.	L. m.	—	++	+	+	—	—	—
4	14.1.	Sch. m.	—	+++	+	—	+	—	—
5	18.1.	K. w.	—	+++	+++	+	—	—	—
6	18.1.	Z. w.	—	—	+++	—	—	—	—
7	18.1.	B. w.	—	+	+	—	—	—	++
8	18.1.	G. w.	—	+++	++	—	—	—	—
9	22.1.	S. w.	—	+++	++	—	—	—	—
10	20.1.	F. w.	—	++	—	—	—	—	—
11	20.1.	S. w.	—	+	—	—	—	—	++
12	22.1.	H. w.	++	++	+	—	+	+	—
13	20.1.	M.m.cand med	—	++	+	—	—	—	+++
14	20.1.	W.m. „ „	—	++	—	—	—	—	—
15	22.1.	M. w.	—	+	+	+	—	—	—

Schema II. Hautkranke.

Nr.	Da= tum	Name	Diagn.	Jodo= form	Jodtink= tur	J'Ako= nittink	Jothi= onöl	Joth. Glyc. Spir.	Dijo= zol	Meta Jedin
1	23.1.	Sch.m.	Acne vulg.	—	+++	+	—	+	—	+
2	23.1.	K. m.	„ „	—	+	+	—	—	—	—
3	23.1.	K. m.	Prur. senil.	—	+	—	—	—	—	—
4	24.1.	V. m.	Ekzem.	—	—	—	—	—	—	—
5	24.1.	D. m.	„	—	+++	—	—	—	—	—
6	24.1.	K. m.	Sycosis vulg.	—	+++	—	—	—	—	—
7	25.1.	D. w.	} chron. Ekz.	—	—	+	—	—	—	—
8	25.1.	Sch.w.		+	—	—	—	—	—	—
9	25.1.	M. m.		—	—	—	—	—	—	—
10	26.1.	K. w.	} „	—	+	+	—	—	—	—
11	26.1.	J. w.		—	+	+	—	—	—	—
12	28.1.	B. m.	Lieben ruplac.	+	+++	—	—	—	—	—
13	28.1.	Fl. w.	chr. Ekzem.	+	+++	+++	+	—	+	—
14	5.2.	L. m.	Ekz.	—	+	—	—	—	—	—
15	5.2.	M. m.	Psoriasis	—	+	—	—	—	—	—

Schema III. Hautgefunde.

Nr.	Da= tum	Name	Phenol	Chlor= Phen.	Chlor= Phen. + Kamph.	Trikresol= formalin	ar= senig. Säure	Euge= nol.	Ver= dünnung
1	17.1.	L. m.	-	-	-	-	-	-	1 : 100 Äther
2	17.1.	Sch. m.	-	-	-	-	-	-	
3	16.1.	Sp. m.	-	-	-	+ Nekrose	-	-	1 : 100 Wasser nicht geeignet
4	16.1.	V. m.	-	-	-	+ Erythron	-	-	
5	16.1.	R. m.	+ Nekrose	-	-	+ Nekrose	-	-	
6	22.1.	R. m.	-	+	+	-	-	-	1 : 100 Äther
7	22.1.	Sch. m.	-	-	-	+	-	++	
8	22.1.	G. m.	-	-	-	-	-	+	2 : 100 Äther
9	24.1.	R. m.	-	-	-	-	-	++	
10	24.1.	Selbstv.	-	-	-	-	-	-	3 : 100 Äther
11	26.1.	T. w.	-	-	+	-	-	-	
12	26.1.	R. w.	-	-	-	-	-	++	3 : 100 Äther
13	28.1.	H. w.	-	-	-	-	+	-	
14	28.1.	H. w.	-	-	-	-	+	-	
15	28.1.	W. w.	-	-	+	-	-	-	

Schema IV. Hautkranke.

Nr.	Da= tum	Name	Diagn.	Phenol	Chlor= Phen.	Chlor= Phen. + Kamph.	Trikresol= solfor= malin	ar= senig. Säure	Euge= nol.	Ver= dünnung
1	30.1.	Sch. w.	Ekzem	+	-	-	-	+	++	3:100 Äther nur 6 St.
2	30.1.	Selbstv.	-	+	-	-	+	-	-	
3	31.1.	F. m.	} Ekzem	+	+	+	+	-	+	} unv. 24 St. 18 St.
4	31.1.	K. m.		+	-	-	+	+	+	
5	31.1.	Sch. m.		+	-	-	-	+	+	
6	9.2.	P. w.	"	-	-	-	+	+	+	3 : 100 Äther 18 St.
7	9.2.	H. w.	"	-	-	-	-	-	+	
8	9.2.	B. w.	Psoriasis	+	+	+	-	+	+	

Zeichenerklärung: - keine Reaktion; plus = Erythem, plus plus = starke Reaktion; + + + = Erosion, bläfige Abhebung.

Literaturverzeichnis.

1. Hedt, Adolf: Die Haut als Testobjekt 1927.
2. Lehner, E.: Allergieerscheinungen der Haut 1927.
3. Memmesheimer, A.: Hautreize und Hautesophylaxie 1927.
4. Maxer, H.: Klinische Studien über Hautgefäßreflexe Dill. 1915.
5. Jadasohn, J.: Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Bd. 7, 1. Teil 1927.
6. Sobotka, Paul: Zur Physiologie der pilomotorischen und der ihnen verwandten Erscheinungen beim Menschen. (Arch. f. Dermatologie 1910).
7. Prof. Nehr Korn: Dijoazol als Hautdesinfiziens. Münchener Medizinische Wochenschrift Nr. 18. 1927.
8. Tachau, P.: Die Rolle der Überempfindlichkeit bei Ekzem. Referat aus M. M. W. 1927, S. 1198.
9. Moog, O.: Hautfunktionsprüfungen 1927 Jena.
10. Rayka, E. u. K.: Pógary über das Verhalten der allergischen und nichtallergischen Haut auf entzündlich=chem. physikalische Einwirkungen. A. f. D. Bd. 153. 1927.
11. Misch, J.: Lehrbuch der Grenzgebiete der Medizin und Zahnheilkunde.
12. Riedke, E.: Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten.
13. Oppenheimer, C.: Anaphylaxie und Idiosynkrasie (Handbuch der Biochemie Bd. 3).
14. Prof. Friedenthal: Metajodin als wirkames äußeres Antiseptikum. Deutsche Med. Wochenschrift 1927, S. 1517.
15. Piorkowsky, M.: Über Metajodin. Medizinische Welt 1928 Nr. 32.
16. Seeliger, P.: Zur Frage der Desinfektion der Haut. D. M. W. S. 321.
17. Priester, E.: Die Bedeutung des Jods für die Zahnheilkunde (Referat nach deutsch. zahnärztl. Wochenschrift 1928 Nr. 25/26).
18. Richter: Über Resorption von Jothion. Bericht aus Archiv für Dermatologie 103, S. 533.
19. Neißer, A.: Über Lippen- und Mundwallerektzeme. Therapeutische Monatschrift von 1898.
20. Galewsky: Über Lippen- bzw. Mundwallerektzeme. M. M. W. Nr. 28 1906.
21. Strascynsky, A.: Zur Frage der Bedeutung der reflektorischen Vorgänge im Organismus nach intrakutaner Reizung. A. f. D. B. 153 H. 1, S. 117.

22. Stern, C.: Untersuchungen zur Entstehung des Bäckerekezems, zugleich Beitrag zur Frage der Funktionsprüfung der Haut. A. f. d. Bd. 153 H. 2.
23. Brügel, S. u. A.: Perutz: Über Klinik und Pathogenese der Erlenhof-dermatitis. (Nebst Beitrag zur Disposition der allerg. Gewerbedermatosen) A. f. D. B. 153 H. 3.
24. Urbach und Steiner: Gerstenstaubidiosynkrasie. Ein Beitrag zur physikalischen Allergie der Haut. A. f. d. B. 153 H. 3.
25. Jellinek, A.: Biologie der gefunden und kranken Haut 1916.
26. Samberger: Idiosynkrasie der Haut. Dermatolog. Wochenschrift B. 84 1927.
27. Fritzler: Veränderungen der Haut durch Jodtinktur. Pathol.-anatomische Untersuchungen an Meeresschweinchen. Bericht nach Naunyn-Schmiedeberg's Arch. f. experiment. Pathologie und Pharmakologie Bd. 114.
28. Bieberfeld: Arzneimittellehre für Zahnärzte.

